

3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» в январе-апреле 2023г. по сравнению с соответствующим периодом 2022г. эпидемиологическая обстановка характеризовалась ростом заболеваемости гриппом, коклюшем, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, сальмонеллезной инфекцией, острыми кишечными инфекциями, вызванными неустановленными инфекционными возбудителями, сифилисом, острыми гепатитами, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), острыми кишечными инфекциями, вызванными установленными инфекционными возбудителями болезнью.

	Январь-апрель 2023г.	В % к январю-апрелю 2022г.	На 100000 человек	
			январь-апрель 2023г.	январь-апрель 2023г. в % к январю-апрелю 2022 г.
Зарегистрировано заболеваний, случаев:				
острыми кишечными инфекциями, вызванными неустановленными инфекционными возбудителями	2382	157,4	181,1	157,3
острыми кишечными инфекциями, вызванными установленными бактериальными, вирусными возбудителями	1789	108,4	136,0	108,4
бактериальной дизентерией	-	-	-	-
сальмонеллезной инфекцией	241	157,5	18,3	157,8
острыми гепатитами	94	140,3	7,1	139,2
туберкулезом	302	96,8	23,0	97,0
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом	107	в 3,1 р.	8,1	в 3,0 р.
паротитом эпидемическим	2	50,0	0,2	66,7
краснухой	-	-	-	-
коклюшем	18	в 3,6 р.	1,4	в 3,5 р.
генерализованных форм менингококковой инфекции	2	100,0	0,2	100,0
острыми инфекциями верхних дыхательных путей	266012	89,4	20227,1	89,4
гриппом	2785	в 10,7 р.	211,8	в 10,7 р.
гонококковой инфекцией	165	96,5	12,5	96,2
сифилисом	223	152,7	17,0	153,2
педикулезом	202	86,3	15,4	86,5
болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)	287	110,8	21,8	110,7

По сравнению с январем - апрелем 2022г. коэффициент заболеваемости гриппом вырос в 10,7 раз, коклюшем – в 3,5 раза, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – в 3,0 раза, сальмонеллезной инфекцией – на 57,8%, острыми кишечными инфекциями, вызванными неустановленными инфекционными возбудителями – на 57,3%, сифилисом – на 53,2%, острыми гепатитами – на 39,2%, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, болезнью вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) – на 10,7%, острыми кишечными инфекциями, вызванными установленными инфекционными возбудителями болезнью – на 8,4%.